



ANJİO İŞLEMİ SONRASI HASTA KABUL KONTROL FORMU

■ Adı, Soyadı: ■ Alerjileri:
■ Hasta ID No: ■ Doğum Tarihi: ■ Bulaşıcı Hastalığı:
■ Tıbbi Tanı: ■ Kan Grubu:

Tarih: / / Saat:

HEMŞİRELİK FAALİYETLERİ	KONTROL		GEREKLİ DEĞİL	YAPILMAMA NEDENİ	HEMŞİRE ADI VE İMZASI
	(+)	(-)			
1. Anjiyo işlemi sonrasına uygun hasta yatağı hazırlandı.					
2. Hasta odası havalandırıldı. Oda ve banyo temizliği sağlandı.					
3. O ₂ manometresi ve kanülü kontrol edildi.					
4. İdrar askısı, mayi askısı ve böbrek küvet temin edildi.					
5. Sürgü/ ördek hasta tuvaletine hazırlandı.					
6. Kum torbası hazırlandı (İşlemi kasıktan yapılan hastalar için).					
ANJİO İŞLEMİ SONRASI HASTA KABUL					
1. Hasta işlemin özelliğine uygun şekilde yatağına alındı.					
2. Hastanın durumuna uygun pozisyon verildi.					
3. Solunum yollarının açıklığı kontrol edildi.					
4. İşlem bölgesi kanama, hematoma yönünden ekstremiteler ısı, renk ve nabız farkı yönünden kontrol edildi.					
5. İşlemden sonra Yaşam bulguları ilk 1 saatte 15 dakikada bir, 2. saatte 30 dakikada bir, 3. saat ve sonrasında ise saatte bir alındı (Hastanın durumuna göre sıklık değişebilir).					
6. Hekim istemleri alındı, düzenlendi.					
7. Hastaya 3-4 saat içinde 1.5 - 2 lt su içmesi gerektiği hatırlatıldı ve hasta teşvik edilerek içmesi sağlandı.					
8. İşlem bölgesi kasık olan hastaya 2.5-3 kg. ağırlığında kum torbası konuldu ve 6 saat kalması sağlandı.					
9. İşlem bölgesi radial arter olan hastanın kol bandı kontrol edildi ve yarım saat sonra 15'er dk. ara ile 5'er ml havası boşaltıldı. (Bileğini oynatmaması, araba kullanmaması ve o bölgeye masaj yapmamasının gerekliliği hatırlatıldı)					
10. İşlemden 1 saat sonra hasta diyetine uygun beslendi.					
11. İşlemden sonra ilk 2 saat içerisinde hasta idrarını yaptı. ☐ Yapamadı, hekime bilgi verildi.					
12. Hastanın mobilizasyonu sağlandı. ☐ (İşlem bölgesi kasık ise işlemden 6 saat sonra) ☐ (İşlem bölgesi radial arter ise işlemden 2 saat sonra)					
13. Hastaya taburcu edilmeden önce eğitim verildi; a) Kontrol randevusu verildi ise gün ve saati, b) İşlem bölgesinde kanama olursa, kanayan yere sıkıca baskı uygulayarak en yakın sağlık kuruluşuna gitmesi. c) 2 gün süre ile ağır efordan kaçınması, d) Araba kullanmaması, e) Taburcu edildikten sonraki gün duş alarak pansuman bandını çıkarması f) Kalıcı pace-maker ve ICD hastalarında hekim istemine göre dikişlerin alınacağı					