



EKSTRAVAZASYON HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

Hastanın Adı, Soyadı:

Hasta ID No:

Doğum Tarihi: / /

Kemoterapi İlaçlarının Damar Dışına Sızdığından Şüphelenilen Durumlarda Yapılması Gereken Uygulamalara ilişkin Bilgiler

Kemoterapi tedavisi alırken bazı ilaçlar.....'a yerleştirilen iğnenin damar dışına çıkması sonucu çevre dokuya sızabilir. Doku hasarı riskinin ve rahatsızlık hissini azaltmak için aşağıdaki önerilere uyunuz.

- ❖ Önümüzdeki 2-3 gün içinde günde 4 kez 15-20 dakika süre ile soğuk kompres uygulayınız.Bu uygulamaya / / tarihine kadar devam ediniz.
- ❖ Önümüzdeki 2-3 gün içinde 4 kez 15-20 dakika süre ile sıcak kompres uygulayınız,mümkünse bu uygulamaya / / tarihine kadar devam ediniz.
- ❖ Kolunuzu 1-2 yastıkla destekleyerek kalp seviyesinin üstünde tutmaya çalışınız
- ❖ Doktor ya da hemşirenizin görüşünü almadan bu bölgeye krem, losyon ya da herhangi bir ilaç uygulamayınız.
- ❖ Bölgeye direk basınç uygulamayınız bandaj ya da sargı uygulamayınız.

Aşağıdaki semptomlardan herhangi birisi olduğunda doktor ya da hemşirenize başvurunuz.

- İlaç verilen damar etrafında kızamıklık, şişlik, yanma ya da ağrı hissi
- Cilt üzerinde siyahlık ya da ciltte soyulma
- Omuz, el ya da bilekte hareket güçlüğü
- Etkilenen bölgede sıcaklık artışı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ, Kemoterapi Ünitesi, 0392 675 10 00 / Dahili: 1291