

**YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
PREMATÜRE RETİNOPATİSİ (ROP)
MUAYENESİ BİLGİLENDİRME FORMU**

Erken doğan bebeklerde gözün retina ismi verilen ağ tabakasındaki damarlar tam olarak gelişmemiştir ve doğumdan sonra gelişimini tamamlar. Retina damarlanması tamamlanmamış bebeklerde kısaca ROP olarak bilinen prematüre retinopatisi hastalığı ortaya çıkabilir. ROP çocuklarda kalıcı körlüğün en sık nedenidir. Erken doğan bebeklerde şaşılık, yüksek numaralı gözlük ihtiyacı, göz tansiyonu gibi göz hastalıklarının olma riski de diğer bebeklere göre daha fazladır. Muayene olmaması halinde hastalığın mevcudiyeti ve ilerlemesi saptanamaz. Bunun sonucunda körlükle sonuçlanabilen görme problemleri gelişebilir ve erken tedavi edilmezse körlüğe neden olabilir. ROP muayenesin ihmal edilmeden yapılması erken tanı ve tedavide önemlidir.

ROP muayenesi ilk olarak bebek doğum haftasına göre 4 haftalık olduğunda yapılmalıdır. Göz damarlarının gelişimine göre muayenenin tekrarlanması gerekebilir.

Hastanın Adı-Soyadı:

Protokol Numarası :

Randevu Tarihi-Saati:

Hasta Yakını (veli veya vasi) Adı-Soyadı (El yazısı ile):

Tarih/ imza:

Eğitim Veren Hemşire: