



YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
HASTANESİ

GÖZE İLAÇ UYGULAMA TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
HEM_T_48	25.06.2012	23.12.2022	RV01	3

REVİZYON DURUMU

“Revizyon Tarihi”

“Açıklama”

“Revizyon No”

23.12.2022

Hastane logosu değiştirildi.

1

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Başhemşirelik	Kalite Koordinatörü	Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı



GÖZE İLAÇ UYGULAMA TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
HEM_T_48	25.06.2012	23.12.2022	RV01	3

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı, göze ilaç uygulamada standart bir yöntem belirlemektir.

2. KAPSAM

Bu talimat göze ilaç uygulama faaliyetlerini kapsar.

3. KISALTMALAR:-

4. TANIMLAR

4.1. Eye shield: Gözü koruyucu kapak.

4.2. Rondel: Gözün üzerini kapatmak için kullanılan steril gazlı bezdir. Genellikle oval şekilde, iki gazlı bez arasında, emici özellikteki pamuktan yapılır.

4.3. Alt forniks: Alt göz kapağının içindeki boşluk.

5. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından hekim ve hemşire sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. TEMEL İLKELER

6.1.1. İlacın üzerine hasta bilgileri ve açılma tarihi yazılmalı, her hasta için ayrı damla ve damlalık kullanılmalıdır.

6.1.2. İlaçlar kendi kapakları ile kapatılmalı ve dik olarak muhafaza edilmelidir.

6.1.3. Birden fazla ilaç var ise, önce damla, sonra pomad kullanılmalı, her ilaç uygulaması arasında en az 5 dakika ara olmalıdır.

6.1.4. Göz için kullanılacak malzemeler steril olmalıdır (pamuk tamponlar, rondeller).

6.1.5. Gözlerden biri enfekte ise, çapraz bulaşmayı önlemek için, tedaviye önce enfekte olmayan gözden başlanmalı ve her göz için ayrı malzeme kullanılmalıdır.

6.1.6. Göz kapakları, ilaç uygulaması öncesinde serum fizyolojikle ıslatılmış steril pamukla silinmelidir.

6.1.7. Göz küreleri üzerine bası yapılmamalıdır.

6.1.8. Hekim istemi olmaksızın, gözlere basınçlı pansuman yapılmamalıdır.

6.1.9. Göz kürelerine, göz kapağına ve kirpiklere; damlalık, pomad tüpünün ucu ya da parmaklarla dokunulmamalı, ilaç uygulamaları 1-2 cm yukarıdan yapılmalıdır.

6.2. UYGULAMA

6.2.1. Malzemeler

- ✓ Tepsi
- ✓ Damlalar, pomadlar
- ✓ Önceden sterilize edilmiş ve serum fizyolojik ile ıslatılmış tamponlar.
- ✓ Steril rondel
- ✓ Flaster
- ✓ Böbrek küvet



GÖZE İLAÇ UYGULAMA TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
HEM_T_48	25.06.2012	23.12.2022	RV01	3

- 6.2.2. Hastanın kimliği protokole uygun olarak doğrulanır. İlaç uygulaması yapılacak gözü belirlenir ve hastaya işlem hakkında bilgi verilir.
- 6.2.3. Hastanın sırt üstü ve başı hafif hiperekstansiyonda yatması sağlanır.
- 6.2.4. Göz kapalı ise (rondel veya eye shield ile) önce kapama açılır.
- 6.2.5. Kirli flaster ve rondeller böbrek küvetinin içine atılır.
- 6.2.6. Islak tampon ile hastanın gözü içten dışa doğru temizlenir.
- 6.2.7. Damlayı damlatacak kişi aktif eline damlayı alır.
- 6.2.8. Diğer eline pamuk tamponu alır ve alt göz kapağını aşağı doğru çektilirerek, gözün alt forniksine damlayı damlatır.
- 6.2.9. Uygulama sonrası gözün etrafına gelen ilaç fazlalığı pamuk tampon ile içten dışa doğru silinir.
- 6.2.10. Göz pomadı sürülecek ise, yaklaşık 1 cm' lik bir şerit halinde alt fornikse, içten dışa doğru sürülür.
- 6.2.11. Eğer hekim isteminde gözün kapanması isteniyorsa, rondel veya eye shield ile göz kapatılır.
- 6.2.11. Atıklar “Atık Yönetimi Prosedürü” ne göre ortamdan uzaklaştırılır.
- 6.2.12. Yapılan işlemler ve değerlendirmeler “Hemşire İzlem Formu” na kaydedilir.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- 7.1. Hemşire İzlem Formu
- 7.2. Atık Yönetimi Prosedürü