

İKİNCİ TRİMESTER TARAMA TESTİ BİLGİ FORMU

Aşağıdaki sorular risk belirlemek için sorulmaktadır. Yapılacak testlere ilave olarak, cevaplarınız belirli faktörler olarak değerlendirmeye dahil edilecektir. Bu cevaplar gizli tutulacaktır. İkinci trimester testlerinin yapılması için ideal zaman 16-18. gebelik haftası olmakla beraber üçlü tarama testi 14 hafta – 22 hafta 6 gün, dördü tarama testi ise 15 hafta – 21 hafta 6 gün arasındaki gebelik haftalarında yapılabilmektedir. 15. haftanın altındaki gebelik haftalarında NTD riski hesaplanamamaktadır.

İstem Yapılan Test

☐

NTD Tarama (Serum) (AFP)

☐

Dördü Tarama Testi (AFP, hCG, uE, inhibin A)

Adı Soyadı:

Doğum tarihi (gün / ay / yıl): / /

Son Adet tarihi (gün / ay / yıl): / /

Numune alma tarihi: / /

Kilo:

Sigara Kullanımı:

İnsülin kullanılan bir şeker hastalığı:

Daha önce kromozom anomalili (Trizomi 18, trizomi 21 vb.) bebek sahibi olma öyküsü:

İlave etmek istenilen diğer risk faktörleri:

Tarama Testi Bilgilerini Okudum: ☐

Tarih: / /

İmza:

IVF gebeliği mi (Evet/Hayır): Yumurta toplama tarihi:/...../..... Transfer tarihi: / /

IVF gebeliği ise: Yumurta donörünün doğum tarihi (gün / ay / yıl): / /

Donmuş embriyo kullanıldıysa embriyonun dondurulma tarihi (gün / ay / yıl): / /

Ultrasonografi Bilgileri

Tarih: / /

BPD değeri (mm):

BPD'ye göre gebelik haftası:

Fetüs sayısı:

Dikkati çeken başka bir bulgu:

DOKTOR İMZASI-KAŞESİ

Sağlıklı bir bebek sahibi olmanız dileğiyle...