



Hasta Adı-Soyadı:		Doğum Tarihi:		HASTA ETİKETİ
Hasta ID No:		Kimlik No:		
Baba Adı:		Cinsiyeti: K ☐ E ☐		
Transfüzyon Tarihi:.....		Saati:	Kan Grubu:	
Klinik / Servis:		Klinik / Servis Tel No:		
Ünite No:		Cross Çalışanın Kimliği, İmzası:		
☐ ES (Eritrosit)		☐ TDP (Taze Donmuş Plazma)	☐ PLT (Trombosit)	☐ Diğer.....
Transfüzyon Öncesi		Transfüzyonun ilk 15 dak.		Transfüzyon Sonrası
Vücut sıcaklığı:°C		Vücut sıcaklığı:°C		Vücut sıcaklığı:°C
Tansiyon:.....mmHg		Tansiyon:.....mmHg		Tansiyon:.....mmHg
Nabız:.....dakika		Nabız:.....dakika		Nabız:.....dakika
Transfüzyon başlama saati:.....		Transfüzyon bitiş saati:.....		Verilen Miktar:.....ml
Premedikasyon:				
Hastada gözlenen transfüzyon reaksiyonları:				
☐ Transfüzyon reaksiyonu yok				
☐ Titreme				
☐ Ateş				
☐ Ürtiker				
☐ Bulantı-Kusma				
☐ Substernal Ağrı				
☐ Kızarıklık				
☐ Hemoglobinuri				
☐ Dispne				
☐ Şok				
☐ Flushing				
☐ Kanama				
☐ Kanama				
☐ Yan Ağrısı				
☐ Baş Ağrısı				
☐ Çarpıntı				
☐ Siyoanoz				
Tanı:				
☐ Febril hemolitik olmayan transfüzyon reaksiyonu		Transfüzyon Yapan 1. Kişinin Adı-Soyadı / İmzası:		
☐ Hemolitik transfüzyon reaksiyonu				
☐ Ürtikeriyal reaksiyon		Kontrolü Yapan 2. Kişinin Adı-Soyadı / İmzası:		
☐ Anafloktoid veya anafloktik reaksiyon				
☐ Transfüzyona bağlı akut akciğer ödemi				
☐ Diğer.....				
TRANSFÜZYON SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR				
Transfüzyon Öncesi		Kontrolü Yapan		
		1.Kişi	2.Kişi	
1) Doktor order'ı kontrol edilir.		☐	☐	
2) Hastanın kimliği ve protokol no'su kontrol edilir.		☐	☐	
3) Transfüzyon için hastadan onay alınır.		☐	☐	
4) Hastanın kan grubu kontrol edilir.		☐	☐	
5) Gönderilen kan komponenti ile hastanın kan grubu uyumu kontrol edilir.		☐	☐	
6) Kan komponentinin son kullanma tarihini gözden geçirilir, görünüm kontrol edilir.		☐	☐	
7) ES kullanılıyorsa hasta adına cross-match yapıldığı kontrol edilir.		☐	☐	
8)Hasta yatak başında ,antijen ve lam kullanılarak, verilecek kan ile hastanın kanının; kan grubu uyum kontrolü yapılır.		☐	☐	
9) Hastanın venöz yolu açılır.		☐	☐	
**Yukarıdaki bilgiler ile ilgili uyumsuzluk veya şüpheniz varsa problem çözülene kadar kesinlikle Transfüzyon'a başlamayınız.				
TRANSFÜZYON SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR				
Transfüzyon reaksiyonu sırasında;				
1) Transfüzyon acilen durdurulur,hastanın damar yolu % 0,9 NaCl ile açılır.				
2) Doktor durumdan haberdar edilir.				
3) Hastanın kimliği kontrol edilir.				
4) Kan ünitesinin ve hastanın ABO ve Rh grubu kontrol edilir.				
5) Kan komponenti, kan verme seti ve beraberinde verilen sıvılar saklanır.				
6) Kan merkezi reaksiyon hakkında bilgilendirilir.				